

INDICACIONES DE LAS VACUNAS PARA LA CAMPAÑA DE INVIERNO 2022 EN FARMACIAS

*FLUXVIR (Vacuna Trivalente Adyuvantada):

NO NECESITAN ORDEN MÉDICA:

- 1) Personas Afiliadas
- 2) Personas Trabajadoras de PAMI (Planta o Contratados) que:
 - **Tengan 65 años o más (Recomendado)**

SÍ NECESITAN ÓRDEN MÉDICA:

- 1) Personas Afiliadas
- 2) Personas Trabajadoras de PAMI (Planta o Contratados) que:
 - **Tengan entre 2 y 64 años y presenten factores de riesgo.**
(En estos grupos se recomienda VIR AFLÚ, pero si no se encuentra disponible en el Stock se puede utilizar FLUXVIR)

Son considerados factores de riesgo: obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedad oncohematológica, trasplante y/o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros.

Recordar que la orden médica puede ser una receta papel o una fotografía de una foto papel, que incluya los datos de la persona a inmunizar (Nombre Completo / DNI y/o Número de Beneficio para afiliados y afiliadas y diagnóstico que indique la condición de riesgo).

*VIR AFLÚ (Vacuna Trivalente):

NO NECESITAN ORDEN MÉDICA:

- 1) Personas Afiliadas
- 2) Personas Trabajadoras de PAMI (Planta o Contratados) que:
 - A) **Sean Personal de Salud Matriculados y/o Trabajadores y Trabajadoras de PAMI (Recomendado)**
 - B) **Tengan 65 años o más (Se recomienda FLUXVIR, pero si no se encuentra disponible en el stock se puede utilizar VIR AFLÚ)**



C) Sean personas gestantes: en cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación.

D) Puérperas: hasta el egreso de la maternidad –máximo 10 días- si no recibió la vacuna durante el embarazo.

E) Niños/as de 6 a 24 meses: deben recibir dos dosis separadas por al menos 4 semanas, excepto los niños/as que ya hubieran recibido dos dosis en años anteriores.

SÍ NECESITAN ÓRDEN MÉDICA:

- 1) Personas Afiliadas
- 2) Personas Trabajadoras de PAMI (Planta o Contratados) que:

- **Tengan entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo (En estos grupos se recomienda VIRAFLÚ, pero **si no se encuentra disponible en el Stock se puede utilizar FLUXVIR**)**

Son considerados factores de riesgo: obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedad oncohematológica, trasplante y/o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros.

Recordar que la orden médica puede ser una receta papel o una fotografía de una foto papel, que incluya los datos de la persona a inmunizar (Nombre Completo / DNI / Número de Beneficio para afiliados y afiliadas).

VACUNAS ANTINEUMOCOCCICAS

Estrategia secuencial

NO NECESITAN ORDEN MÉDICA:

- 1) Personas Afiliadas
- 2) Personas Trabajadoras de PAMI (Planta o Contratados) que:

Personas de 65 años y más:

-Esquema de vacunación secuencial- **No necesitan orden médica.** Se recomienda aprovechar la oportunidad para recibir vacuna antigripal.

1º dosis: VCN13 (POR ÚNICA VEZ, INDAGAR NO HABERLA RECIBIDO EN INSTANCIAS PREVIAS)

2º dosis: VPN23 con un intervalo mínimo de 12 meses luego de la VCN13. **Vacuna no disponible por falta a nivel global.**



SÍ NECESITAN ÓRDEN MÉDICA:

1) Personas Afiliadas

2) Personas Trabajadoras de PAMI (Planta o Contratados) que:

Sean personas de entre 5 y 64 años que presenten condiciones de riesgo.

Recordar que la orden médica puede ser una receta papel o una fotografía de una foto papel, que incluya los datos de la persona a inmunizar (Nombre Completo / DNI y/o Número de Beneficio para afiliados y afiliadas y diagnóstico que indique la condición de riesgo).

Las indicaciones son:

A. Inmunocomprometidos (inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, infección por VIH, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, leucemia, linfoma y enfermedad de Hodgkin, enfermedades neoplásicas, inmunodepresión farmacológica, trasplante de órgano sólido, mieloma múltiple, asplenia funcional o anatómica, anemia de células falciformes, implante coclear, fístula de LCR)

- **1era. dosis: vacuna conjugada 13 valente**

2da. dosis: vacuna polisacárida 23 valente a las 8 semanas. **Vacuna no disponible por falta a nivel global.**

1er. refuerzo: vacuna polisacárida 23 valente a los 5 años. **Vacuna no disponible por falta a nivel global.**

2do. refuerzo: vacuna polisacárida 23 valente a los 65 años (si el primer refuerzo fue administrado antes de los 60 años).

Vacuna no disponible por falta a nivel global.

B. No Inmunocomprometidos (cardiopatía crónica, enfermedad pulmonar crónica, diabetes mellitus, alcoholismo, enfermedad hepática crónica, tabaquismo)

- **1era. dosis: vacuna conjugada 13 valente**

2da. dosis: vacuna polisacárida 23 valente al año de la primera dosis. **Vacuna no disponible por falta a nivel global.**

1er. refuerzo: vacuna polisacárida 23 valente a los 65 años (respetando intervalo mínimo de 5 años con dosis previa). **Vacuna no disponible por falta a nivel global.**

C. Trasplante de células hematopoyéticas

Inicio de la vacunación a partir de los 6 meses del trasplante con **vacuna conjugada 13 valente (esquema 0, 2 y 4 meses)**. A los 12 meses de finalizado esquema completar con 4ª dosis con vacuna polisacárida 23 valente o conjugada 13 valente si hubiera enfermedad injerto contra huésped.

Ante dudas o inquietudes: vacunación@pami.org.ar

